

РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
**КОРПОРАТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ**



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ИМУН



РЦОЗ МП



РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ФСС РФ по УР

Ревакцинация – повторное введение прививки с целью повышения иммунитета.

**Через какое время после постановки
прививки от COVID-19 необходимо
проводить ревакцинацию?**

Повторная вакцинация в условиях подъема заболеваемости рекомендуется один раз в полгода (через 6 месяцев).

После достижения Российской Федерацией уровня коллективного иммунитета (вакцинировано более 80 % населения) вакцинация будет идти в плановом порядке 1 раз в год.



**Какой вакциной можно
проводить ревакцинацию?**

Повторная вакцинация от COVID-19 может проводиться любым из зарегистрированных в России препаратов.



**Нужно ли перед ревакцинацией
сдавать анализ на антитела?**

Сдача анализа на антитела перед повторным введением вакцины не требуется.



**Надо ли носить маску после
постановки вакцины?**

Соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах, гигиеническая обработка рук необходимы даже после постановки вакцины.

